

ATENDIMENTO A PACIENTE COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA RECESSIVA

Thainã Neves BARBOSA¹, Ana Maria Rebouças RODRIGUES², Cybelle Luísa de Souza PEREIRA², Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN³

¹ Acadêmica de Odontologia/UNINCOR - e-mail: thaynatnb@hotmail.com

² Co-Orientadoras e Professoras do Curso de Odontologia/UNINCOR

³ Orientadora e Professora do Curso de Odontologia e do Mestrado em Clínica Odontológica/UNINCOR - e-mail: prof.soraya.grossmann@unincor.edu.br

Palavras-Chave: epidermolysis bullosa; genetics

Resumo

Paciente C.O.B.S, masculino, 6 anos, procurou atendimento na UNINCOR, com lesões cáries e higiene dental insatisfatórios. Durante anamnese constatou-se que o paciente apresentava epidermólise bolhosa distrófica recessiva, anemia, baixo peso, em uso constante de Neutrofer, Profol e Óleo mineral. No exame extra-bucal observou-se múltiplas lesões véscico-bolhosas e ulceradas cutâneas envolvendo membros, tronco e face. Ao exame intra-bucal foram observadas várias ulcerações em mucosa bucal, lábio e língua, além de dificuldade de movimentação da língua. Diagnosticou-se lesões cáries (54, 64, 84, 85, 71, 81) assintomáticas, manchas brancas (51, 55, 61, 65, 75) e apinhamento dentário. Foi solicitada uma radiografia panorâmica para avaliação da dentição permanente. Diante da história, achados clínicos e radiográficos foi proposto um protocolo de atendimento incluindo cuidados pré, trans e pós-operatórios. A responsável foi orientada a higienizar os dentes da criança com escova bitufo extra-macia e foram sugeridas mudanças nos hábitos alimentares. Previamente ao atendimento odontológico restaurador foi indicado o uso de bochecho com solução de saliva artificial (Biotene), 3x/dia; bochecho com clorexidina 0,12%, 2x/dia; e uso de Bepantol nos lábios. Durante o atendimento clínico foi usado Bepantol nos lábios e o paciente chupou um picolé para minimizar a sintomatologia, sendo realizados ART com CIV - Ketac molar (54, 64, 84, 85, 71, 81), selante (55, 65, 75, 61, 51), e aplicação de fluorniz nos dentes. Todos os procedimentos foram realizados em uma única sessão, sem anestesia. Após os procedimentos, foram prescritos uso tópico bucal de Dexametasona (0,1 mg/ml/100ml), 2x/dia, e Nistatina (100000 UI/200ml), 3x/dia, durante 15 dias; Oral Balance gel, 3x/dia, Solução de saliva artificial Biotene, 3x/dia, NaF (solução/200ml/0,05%), 3x/dia, e complementação com Nutren Kids, 1x/dia, uso constante. No acompanhamento de 15 dias o paciente apresentou melhora significativa da saúde bucal, e não relatou nenhuma bolha após a manipulação da mucosa, para que o tratamento odontológico fosse realizado.