

DOENÇAS AUTO-IMUNES COM MANIFESTAÇÕES BUCAIS – PÊNFIGO

Anna Laura Pontes SOARES¹, Daniel Augusto Moreira CAMPOS², Deiziellem da Consolação RIBEIRO³, Érika Ferreira Costa FELÍCIO⁴, Ingrid Mykaele Gomes FREITAS⁵, Jéssica Priscila Alves VELOSO⁶, Natália Ferreira SIMÕES⁷, Polliana Monteiro Pereira DUARTE⁸, Rodrigo Paolinelli GARCIA⁹, Letícia MARTINS¹⁰

¹⁻⁹Estudantes de Odontologia/UNINCOR - e-mail: rodrigopllg@live.com

²Orientador e Professor do Curso de Odontologia/ UNINCOR- e-mail: prof.leticia.ramos@unincor.edu.br

Palavras-Chave: Pênfigo, Doença auto-imune

RESUMO

Pênfigo é uma doença auto-imune rara que causa formação de bolhas na pele e nas mucosas. Embora ainda não se conheça a verdadeira causa do problema, por motivos desconhecidos, produz anticorpos que atacam os tecidos do próprio organismo. Este fenômeno, designado acantólise, proporciona a separação das células da camada espinhosa e a conseqüente existência de espaços livres que, ao encherem-se de líquido, permitem a formação das típicas bolhas que caracterizam a doença. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema, demonstrar a importância da atuação do dentista e elaborar uma ação educativa buscando aplicação prática junto ao paciente. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados disponíveis em artigos da sociedade brasileira de dermatologia. O diagnóstico é realizado através de exame visual por um dermatologista observado a aparência e localização das bolhas sob o microscópio, o médico irá procurar separação celular, que é característica de pênfigo. A Imunofluorescência direta é tratada em laboratório com um composto químico para encontrar os anticorpos anti-desmogleína. Os tipos de anticorpos encontrados podem determinar o tipo da doença. A Imunofluorescência indireta irá testar o nível de anticorpos no sangue, determinando o tipo de pênfigo e a gravidade da doença. Tipos de pênfigo: Pênfigo Foliáceo: tipo comum em áreas tropicais do Brasil envolve feridas com crostas ou bolhas que frequentemente aparecem em primeiro lugar na face e couro cabeludo e, no tórax e outras partes do corpo. As feridas são superficiais e coçam, raramente são dolorosas. O Pênfigo Vulgar é o tipo mais comum, nos Estados Unidos. Bolhas suaves aparecerem na pele e mucosas, as feridas quase sempre começam na boca e são mais dolorosas. A pele fica mais frágil. O tratamento envolve o uso de corticosteroides orais em altas doses, além de medicamentos anti-inflamatórios que suprimem o sistema imunitário. O tratamento prescrito dependerá da gravidade da doença. Ao realizar esse trabalho concluímos que de uma forma geral o estudo da doença proporciona o diálogo entre diferentes disciplinas e vem mostrando a importância em algumas formações profissionais, podendo até considerar como uma exigência do terceiro milênio para realizar pesquisas e para construção do conhecimento.