

## RELATO DE CASO CLÍNICO: DENTE SUPRANUMERÁRIO NA REGIÃO ANTEROPOSTERIOR DE MAXILA.

**João Henrique Peixoto CLARA<sup>1</sup>, Matheus Henrique Lopes DOMINGUETE<sup>2</sup>, Paulo Roberto DOMINGUETE<sup>3</sup>, Bruno Henrique Figueredo MATTOS<sup>3</sup>, Alexandre Augusto Sarto DOMINGUETE<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Estudante de Odontologia/Unincor – e-mail: [joaohenriquepc@hotmail.com](mailto:joaohenriquepc@hotmail.com)

<sup>2</sup>Orientador e Professor do Curso de Odontologia/Unincor – e-mail: [matheusdominguete@ig.com.br](mailto:matheusdominguete@ig.com.br)

<sup>3</sup>Professor do curso de Odontologia/Unincor

<sup>4</sup>Aluno do programa de pós graduação em Clínica Odontologica/Unincor

**Palavras-Chaves:** Hiperdontia, Dente supranumerário

### RESUMO

Dente supranumerário é definido como uma anomalia de desenvolvimento caracterizado pela presença de um ou mais elementos dentários além do número considerado normal de uma arcada. Podendo ocorrer de forma unitária ou múltipla na mandíbula, na maxila ou em ambas as arcadas, com maior freqüência na dentição permanente em pacientes portadores de patologias sistêmicas. A forma mais comum é o mesiodens, que consiste em um dente conóide, geralmente encontrado na região anterior mediana da maxila. Não se sabe ao certo o fator que provoca esta formação, mas a alteração de desenvolvimento causada por uma hiperatividade da lâmina dentária é a teoria mais aceita. A maioria dos dentes supranumerários são assintomáticos por estarem quase sempre retidos e em 90% dos casos estão localizados na região anterior da maxila. Caso não ocorra sua erupção, é possível acarretar algumas complicações, tais como: impactação, erupção atrasada ou ectópica, rotação ou deslocamento, dilaceração de dentes permanentes, apinhamento, desenvolvimento de diastema na linha média, reabsorção de dentes. O diagnóstico é realizado por achados radiográficos de rotina, geralmente por radiografias panorâmicas, oclusais e periapicais, e o tratamento apropriado é a remoção do dente supranumerario, caso não existirem patologias locais. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de um dente supra numerário removido da região anterior de maxila ocorrido na clínica de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Unincor e correlacionar com evidências científicas sobre este fenômeno encontradas na literatura atual buscando visar à prevalência, diagnóstico indicações, contra indicações, e o tratamento realizado para o sucesso do caso.