

FRENECTOMIA LINGUAL EM ODONTOPEDIATRIA

Thamirys de Souza Fernandes LIMA¹, Bethânia Pinheiro dos SANTOS², Carolina Freitas LAGE³, Kelly Oliva JORGE⁴

- ¹ Estudante de Odontologia/Unincor e-mail: thamirysraul@hotmail.com
² Estudante de Odontologia/Unincor e-mail: bethaniapinheiro@hotmail.com
³ Orientadora e professora do curso de odontologia/Unincore-mail: carolinaitabira@yahoo.com.br
⁴ Co-orientadora e professora do curso de odontologia /Unincor e-mail: kellyoliva@hotmail.com

Palavras chave: Frenectomia, Submucosa, Singual.

RESUMO

Objetivou-se relatar um caso de frenectomia realizada na clínica odontológica da Unincor em Belo Horizonte MG. O freio lingual, por vezes, pode apresentar alterações no seu tamanho, dificultando algumas tarefas da língua podendo restringir a sua mobilidade. A anquiloglossia é uma anomalia do desenvolvimento caracterizada por alteração no frênulo da língua resultando em limitações dos movimentos dessa estrutura, gerando dificuldade na fala e com isso, na convivência social da criança. A frenectomia é uma boa resolução cirúrgica para os problemas do freio e pode ser efetuada por várias técnicas convencionais e a laser, apresentando diferença na sua execução, na cicatrização e no pós-operatório. Paciente N.M.A, sexo masculino, 7 anos de idade, apresentando freio lingual curto, foi encaminhado pelo fonodiolgista com relato de dificuldade na movimentação dos lábios alterando a reprodução de alguns sons. A cirurgia foi realizada com a incisão do tecido fibroso na submucosa, a anestesia é dolorosa e conta com a colaboração extrema do paciente, sendo esta aplicada em ponta de língua e região alveolar inferior direita e esquerda. Com a língua tracionada é feita a incisão e divisão do freio, sendo este cuidadosamente excionado sem prejuízo ap perósteo. O pós-operatório é delicado, sendo importante os cuidados e atenção dos responsáveis auxiliando na ingestão de alimentos líquidos e gelados, além de higienização delicada preservando os pontos presentes da sutura que se rompe sozinha na maioria dos casos. O pós-operatório do paciente foi favorável. O mesmo vai iniciar o acompanhamento fonodiológico e continuará com supervisão odontológica. Conclui-se que a frenectomia lingual é uma cirurgia com alto índice de sucesso, desde que realizado após um correto diagnóstico e indicação precisa.

