

LESÕES E CONDIÇÕES CANCERIZÁVEIS DE BOCA- REVISÃO DE LITERATURA

Danilo Montalvão MAGALHÃES¹, André O. Naufel de TOLEDO²

¹Estudante de Odontologia/ UNINCOR- E-mail: montalvao17@hotmail.com

²Orientador e Professor do curso de Odontologia/ UNINCOR- E-mail: andre_naufel@hotmail.com

PALAVRAS CHAVE: Líquen plano, lesões cancerizáveis, leucoplasia.

Alguns tipos de lesões podem anteceder o câncer bucal, sendo assim denominadas de lesões pré-cancerizáveis ou pré-malignas. O processo de carcinogênese pode depender do genoma celular (fatores genéticos), agentes infecciosos e imunológicos. Portanto, tem como objetivo demonstrar a representatividade destas lesões cancerizáveis evidenciando clinicamente o processo de evolução. O método utilizado foi avaliar características clínicas e histopatológicas de lesões cancerizáveis da cavidade bucal, dentre elas: líquen plano, leucoplasia, nevus e queilite. As lesões e condições cancerizáveis está relacionada à fatores externos como, tabaco, álcool, excesso a exposição solar e até mesmo a má higienização. Para pacientes com lesões cancerizáveis, é de suma importância um diagnóstico precoce, para não haja evolução da doença, e conscientização, o que diminui a quantidade de pacientes em estágios avançados.