

# MENSURAÇÃO DA SOBREVIDA DE PACIENTES APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER DE ESÔFAGO

Hélio Leonardus Wagner Poti SALES<sup>1</sup>, Bruno RIGHI<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Acadêmico do Curso de Medicina/UNINCOR*

<sup>2</sup>*Orientador e Professor dos Cursos de Medicina/UNINCOR*

*e.mail: prof.soraya.grossmann@unincor.edu.br*

**Palavras chaves: Câncer; esôfago; sobrevida.**

## **Resumo**

Pesquisa de caráter quantitativo, com objetivo de mensurar a sobrevida de pacientes com neoplasia de esôfago atendidos no Hospital Mario Penna de Belo Horizonte, MG, em janeiro de 2010 a dezembro de 2011, através do estudo e revisão dos prontuários hospitalares. O câncer de esôfago segundo dados do INCA 2000, é o sexto tipo de carcinoma mais mortal. Os dois tipos mais prevalentes de CA de esôfago são: adenocarcinoma e carcinoma epidermoide escamoso. Sendo assintomático na fase aguda, seu diagnóstico precoce torna-se difícil. O tratamento pode abranger tanto a cirurgia, quimioterapia e radioterapia ou a combinação dos três.