

MANIFESTAÇÕES ORAIS DA SÍFILIS SECUNDÁRIA

Renato Assis Machado, Estela Kaminagakura Tango, Luciana Yamamoto de Almeida,
Yasmin Rodarte Carvalho, Jorge Esquiche León

Sífilis é uma doença infecciosa sexualmente transmitida, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A sífilis primária se manifesta na cavidade oral como uma úlcera solitária geralmente em lábio ou língua (“cancro duro” comumente com resolução espontânea), podendo ser confundida com outras lesões ulcerativas de origem traumática, autoimune ou maligna. As manifestações orais da sífilis secundária (placas mucosas) se associam frequentemente com lesões cutâneas (roséola sífilítica). A detecção do agente etiológico nem sempre é possível pela análise microscópica. Assim, a correlação clínico-patológica associada a estudos sorológicos é essencial para estabelecer o diagnóstico de sífilis. Relatamos três casos de sífilis, enfatizando a importância da identificação de lesões bucais para o diagnóstico final. Em todos os casos, as biópsias incisionais foram altamente sugestivas para o diagnóstico de sífilis, o qual foi confirmado pelos testes sorológicos. Os cirurgiões-dentistas devem ter conhecimento das manifestações bucais desta doença infecciosa emergente e de seus aspectos clínicos variados, no diagnóstico diferencial de outras condições, para estabelecer protocolos terapêuticos adequados.

Referências:

1. SO, S.G.S.; KOVARIK, C.L.; HOANG, M.P. Skin Clues to a Systemic Illness. Arch Pathol Lab Med, v.130, p.737-738, 2006.
2. FICARRA, G.; CARLOS, R. Syphilis: The Renaissance of an Old Disease with Oral Implications. Head and Neck Pathol, v.3, p.195–206, 2009.
3. HOANG, M.P.; HIGH, W.A.; MOLBERG, K.H. Secondary syphilis: a histologic and immunohistochemical evaluation. J Cutan Pathol, v.31, p.595–599, 2004.