

ADENOMA CANALICULAR EM LÁBIO SUPERIOR: RELATO DE CASO

Juliana de Souza do Nascimento, Sílvia Paula de Oliveira, Ademar Takahama Junior,
Gustavo Wanderley Lopes de Azevedo, Rebeca de Souza Azevedo

¹Universidade Federal Fluminense - Nova Friburgo/RJ (FOUFF-NF/RJ); ² Odontoclínica Central do Exército do Rio de Janeiro/RJ (OCEX/RJ)

O adenoma canalicular é uma neoplasia benigna incomum que pode se desenvolver nas glândulas salivares menores, principalmente no lábio superior, na mucosa jugal e no palato. Esta entidade compreende somente 1% de todas as patologias de glândulas salivares e atinge principalmente as mulheres na sétima década de vida. Clinicamente, apresenta-se como um aumento de volume submucoso, indolor de crescimento lento e cor variando do róseo ao azulado. Microscopicamente, é formado por cordões compostos por uma única camada de células epiteliais que circundam estruturas ductais e colunares apresentando o núcleo intensamente basofílico. Em alguns casos, ocorre a formação de espaços císticos e o epitélio pode se projetar para o interior da luz cística. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de adenoma canalicular localizado em mucosa do lábio superior. Paciente do sexo feminino, leucoderma, 72 anos, foi encaminhada para atendimento na Clínica de Estomatologia para avaliação de lesão em mucosa labial superior. Ao exame físico, observou-se um nódulo de consistência firme, superfície lisa, indolor, com base séssil, medindo cerca de 3,0 cm de diâmetro. Diante da hipótese diagnóstica de adenoma pleomórfico, a paciente foi submetida a biópsia excisional sob anestesia local. O exame microscópico revelou fragmentos de tecido mole não encapsulados compostos de cordões de uma camada de células epiteliais cuboidais circundando canais e ductos glandulares em meio a um estroma frouxo e bem vascularizado, assim estabelecendo o diagnóstico final de adenoma canalicular. O presente caso clínico evidencia a importância do diagnóstico diferencial para lesões nodulares em cavidade oral, além de destacar a relevância de uma análise histopatológica criteriosa para o diagnóstico definitivo do adenoma canalicular.

REFERÊNCIAS

SMULLIN, S.E. *et al.* Canalicular adenoma of the palate: case report and literature review. **Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod**, v. 98, n. 1, p. 32-36, 2004.

ZANICOTTI, R.T.S. *et al.* Canalicular adenoma of the minor salivary gland in the upper lip: case report. **J. Oral Diag**, v. 1, n. 1, p. 4-6, 2012.

MATSUZAKA, K. *et al.* Canalicular adenoma arising in the upper lip: review of the pathological findings. **Bull Tokyo Dent Coll**, v.45, n. 4, p. 229-233, 2004.